Vabimo vas na **TEST Z NAGIBNO MIZO.**

TEST Z NAGIBNO MIZO – NAVODILA ZA PACIENTE, ENDOMED D.O.O.

NAMEN PREISKAVE:

Test z nagibno mizo izvajamo za ugotavljanje vzroka za omotico/omedlevico. Pri tem poustvarimo

okoliščine, ko med spremembo telesnega položaja pride do refleksnega znižanja pritiska in/ali srčne

frekvence, zaradi česar se zmanjša pretok krvi skozi možgane in tako pride do omotice/omedlevice.

MOŽNI ZAPLETI:

Gre za zelo varno preiskavo, kljub temu pa obstajajo nekatera tveganja za neželene učinke, kot so:

- omedlevica (namenoma izzvana)

- slabost, bruhanje

- dlje časa trajajoč nizek pritisk, omotičnost, slabo počutje

- zelo redko vztrajajoč počasen utrip ali odsotnost utripa, ki terja aplikacijo zdravil

PRIPRAVA NA TEST:

Na test pridete tešči, vsaj 2 uri pred testom ne uživajte hrane in pijače. Zdravila lahko zaužijete, razen če dobite izrecno drugačna navodila.

OPIS PREISKAVE:

Pacient leže na preiskovalno mizo. Medicinska sestra mu izmeri pritisk, priklopi ga na EKG monitor, v žilo mu vstavi vensko kanilo za aplikacijo zdravil, če bi bila potrebna.

Preko kolen in trupa pacienta s pasovi pričvrstimo na mizo.

Po nekaj minutah v ležečem položaju pacienta nagnemo v poševni pokončni položaj za približno 30 minut. Če vmes ni nobenih simptomov, apliciramo nitroglicerin pod jezik.

Test prekinemo ob pojavu omedlevice ali po določenem času.

V vseh položajih neprekinjeno spremljamo srčni utrip in pogosto izmerimo pritisk.

RAZLAGA REZULTATOV

Na podlagi tega, ali med preiskavo pride do simptomov (omedlevica, omotica) ter z interpretacijo rezultatov meritev pritiska in srčne frekvence bo zdravnik ugotavljal vzrok za ponavljajoče se omedlevice.

PRIVOTITEV PO POJASNILU:

Spodaj podpisani

_____ izjavljam, da

sem razumel vsa pojasnila v zvezi s testom in soglašam z njegovo izvedbo.

Datum: _____ Podpis:_____